



Buxoro davlat universiteti
BUXORO, 200117, M.IQBOL ko'chasi, 11-uy, 2022




@buxdu_uz



@buxdu1



@buxdu1



www.buxdu.uz

«AMALIY MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI»
XALQARO ILMUY-AMALIY ANJUMAN



TOSHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETI
Tashkent state
transport university



BUXORO
DAVLAT
UNIVERSITETI



«AMALIY MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING
ZAMONAVIY MUAMMOLARI»
XALQARO ILMUY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI

A B S T R A C T S
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«MODERN PROBLEMS OF APPLIED MATHEMATICS AND
INFORMATION TECHNOLOGIES»

МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

2022-yil, 11-12 may



BUXORO – 2022

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
В.И. РОМАНОВСКИЙ НОМИДАГИ МАТЕМАТИКА ИНСТИТУТИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТРАНСПОРТ УНИВЕРСИТЕТИ
БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ**

*Бухоро фарзанди, Беруний номидаги Давлат мукофоти лауреати, кўплаб
ёши изланувчиларнинг ўз йўлини топиб олишида раҳнамолик қилган етук
олим, физика-математика фанлари доктори Ғайбулла Назруллаевич
Салиховнинг 90 йиллик юбилейларига багишланади*

**АМАЛИЙ МАТЕМАТИКА ВА
АҲБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ
ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ**

**ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ**

2022 йил, 11-12 май

БУХОРО – 2022

$$U|_{\Gamma} = \varphi(s), 0 \leq s \leq L,$$

L : – Геогрическая кривая Γ в плоскости (x, y) , ограниченная изнутри; A – фигура, ограниченная изнутри кривой Γ ; $b(x)$ – функция, определенная на Γ .

$$\begin{aligned} U(x, +0) &= U(x, -0), 0 \leq x \leq 1, \lim_{y \rightarrow +0} x^{2p} U_y = a(x) \lim_{y \rightarrow -0} (-x)^{2p} U_y \\ &+ b(x), 0 < x < 1, \lim_{\xi \rightarrow -0} U(\xi, \eta) = A(\eta) \lim_{\xi \rightarrow +0} U(\xi, \eta) + B(\eta), \end{aligned}$$

$$\lim_{\xi \rightarrow -0} \frac{\partial}{\partial \xi} \int_{-\eta}^{\xi} (\xi - t)^{-\lambda} U(t, \eta) dt = C(\eta) \lim_{\xi \rightarrow +0} \frac{\partial}{\partial \xi} \int_{-\eta}^{\xi} (\xi - t)^{-\lambda} U(t, \eta) dt + D(\eta),$$

бу yerda $\xi = x + y$, $\eta = x - y$, $0 < \eta < 1$, $0 < \lambda < 1$, $a(x), b(x), A(\eta), B(\eta)$,

$C(\eta), D(\eta)$ – yopiq oraliqda birinchi tartibli uzlusiz hosilaga ega funksiyalar.

Chegaraviy masala birikish shartlaridan foydalanilib [1-2], singulyar integral tenglamalar sistemasiga keltiriladi. Karleman-Vekua usuli yordamida integral tenglamalar sistemasi regularyazasiya qilinib, Fredgol'm integral tenglamalar sistemasiga olib kelinadi. Berilgan $\varphi(s)$, $\tau(y)$, $a(x)$, $b(x)$, $A(\eta)$, $B(\eta)$, $C(\eta)$, $D(\eta)$ funksiyalarga aniq shartlar qo'yilib, chegaraviy masala yagona yechimiga ega bo'lishi isbotlanadi [3-7].

ADABIYOTLAR

1. Расулов X.P., Ахмедов О.С. Об одной краевой задаче для нелинейного уравнения эллиптического типа с двумя линиями вырождения // Математика-нинг замонавий масалалари: муаммолар ва ечимлар, Республика миқёсидағи илмий онлайн конференция материаллари түплами, Термиз, 2020, с.152-153.
2. Салохитдинов М.С., Расулов X.P. (1996). Задача Коши для одного квазилинейного вырождающегося уравнения гиперболического типа // ДАН Республики Узбекистан, №4, с.3-7.
3. Расулов X.P. (1996). Задача Дирихле для квазилинейного уравнения эллиптического типа с двумя линиями вырождения // ДАН Республики Узбекистан, №12, с.12-16.
4. Rasulov H. Boundary value problem for a quasilinear elliptic equation with two perpendicular line of degeneration // Центр научных публикаций (buxdu.uz) 5:5 (2021).
5. Rasulov X.R. Boundary value problem in a domain with deviation from the characteristics for one nonlinear equation of a mixed type // Modern problems of applied mathematics and information technologies Al-Khwarizmi 2021, Fergana, p. 149.
6. Xaydar R. Rasulov. On the solvability of a boundary value problem for a quasilinear equation of mixed type with two degeneration lines // Journal of Physics: Conference Series 2070 012002 (2021), pp.1-11.
7. Rasulov X.R. (2020). Boundary value problem for a quasilinear elliptic equation with two perpendicular line of degeneration // Uzbek Mathematical Journal, №3, pp.117-125.

О'ZGARUVCHAN KOEFFITSIYENTLI ELASTIK-YOPISHQOQ TENGLAMASI UCHUN TESKARI MASALA

¹Bozorov Z.R., ²Davlatova D. S.

O'zFA V.I. Romanovskiy nomidagi Matematika instituti, Toshkent, O'zbekiston
BuxDU, Buxoro, O'zbekiston

Gorizontal o'q bo'yicha kuchsiz maxsuslikka ega bo'lgan muhitda integro-differensial to'lqin tenglamasidan integral hadining yadrosini aniqlash bo'yicha quyidagi teskari masalani tadqiq qilamiz:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = Lu + \int_0^t k(x, \tau) Lu(x, z, t - \tau) d\tau \quad (1)$$

$$u|_{t<0} \equiv 0, \quad u_z|_{z=0} = \delta(x) \cdot \delta'(t) \quad (2)$$

$$u|_{z=0} = g(x, t) \quad (3)$$

bu yerda $(x, z, t) \in R_+^3 := \{(x, z, t) : x \in R, t > 0, z > 0\}$, $\delta(x), \delta'(t)$ – mos ravishda Dirakning delta funksiyasi va uning hosilasi,

$$Lu = \mu(z)(u_{xx} + u_{zz} + u_z),$$

$\mu(z) > 0$ – Lame koeffitsiyenti.

Dastlab (1) tenglamani

$$y = \int_0^z \frac{d\xi}{\sqrt{\mu(\xi)}} \quad (4)$$

almashtirish yordamida qayta yozib,

$$u(x, l(y)t) =: U(x, y, t); \quad \tilde{\mu}(y) = \mu(l(y))$$

belgilashlar kiritamiz: bu yerda $l(y)$ funksiya y va z o'rtasidagi bog'lanish.

Almashtirishlarni (1) tenglamaga keltirib qo'yish natijada, (1) tenglama quyidagi ko'rinishni oladi:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \tilde{\mu}(y) \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - a(y) \frac{\partial U}{\partial y} == \int_0^t k(x, \tau) \left(\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \tilde{\mu}(y) \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - a(y) \frac{\partial U}{\partial y} \right) d\tau \quad (5)$$

bu yerda $a(y) = \frac{2\tilde{\mu}(y) + \tilde{\mu}'(y)}{2\tilde{\mu}^2(y)}$ ga teng.

Faraz qilaylik, noma'lum $k(x, t)$ yadro x o'zgaruvchiga kuchsiz bog'liq bo'lsin, ya'ni :

$$k(x, t) = k_0(t) + \varepsilon x k_1(t) + \dots \quad (6)$$

bu yerda ε –kichik parametr.

Ushbu ishda biz $k_0(t)$ funksiyani topish bilan shug'ullanamiz. Buning uchun (1), (2) masala yechimini

$$U(x, y, t) = U_0(x, y, t) + \varepsilon U_1(x, y, t) + \dots \quad (7)$$

va $g(x, y, t)$ ni

$$g(x, y, t) = g_0(x, y, t) + \varepsilon g_1(x, y, t) + \dots \quad (8)$$

ko'rinishda yozamiz.

Ishning asosiy maqsadi (3) qo'shimcha shart asosida (1)-(2) masaladan U_0 va k_0 funksiyalarni topish talab etiladi.

U_0 va k_0 funksiyaning ε bo'yicha yoyilmalarini (1), (5) tenglamalarga qo'yiladi va natijada bir xil darajali ε lar oldidagi koeffitsiyentlarni tenglashtirish natijasida U_0 , k_0 funksiyalarga nisbatan quyidagi masalaga kelamiz:

$$\frac{\partial^2 U_0}{\partial t^2} = \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} - \tilde{\mu}(y) \frac{\partial^2}{\partial x^2} + a(y) \frac{\partial}{\partial y} \right) \left[U_0 + \int_0^t k_0(\tau) U_0(x, y, t - \tau) d\tau \right] \quad (9)$$

$$U_0|_{t<0} \equiv 0, \quad (10)$$

$$U_{0y}|_{y=0} = \sqrt{\tilde{\mu}(0)} \delta(x) \cdot \delta'(t) \quad (11)$$

$$U_0|_{y=0} = g_0(x, t) \quad (12)$$

(9)-(12) masalani $D_T = \{(x, y, t) : x \in R, 0 \leq y \leq t \leq T - y\}$ sohada qaraymiz.

Quyidagi teorema o'rinli:

Teorema. Faraz qilaylik, $g_0(t) = -\sqrt{\tilde{\mu}(0)} \delta(t) + \theta(t) g_{00}(t)$ bo'lib $\tilde{\mu}(y) \in C^3 \left[0, \frac{T}{2} \right]$ sinfdan

bo'lsin, bu yerda $g_{00}(t) \in C^2[0, T]$ –ma'lum funksiya va $\theta(t) – Xevisayde funksiyasi$ bo'lib, $\delta(t) = \frac{d\theta}{dt}$.

U holda ixtiyoriy tayinlangan $T > 0$ lar uchun (9)–(12) teskari masalaning $k(t) \in C^2[0, T]$ sinfga tegishli yagona yechimi mavjud, bu yerda

$$g_m(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^m g_m(x, t) dx, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

O'ZGARUVCHAN KOFFITSIYENTLI ELASTIK YOPISHHQOQLIK TENGLAMASIDAGI INTEGRAL HAD YADROSINI ANIQLASH.

¹Bozorov Z.R., ²Avezov B.A.

V.I. Romanovskiy nomidagi Matematika instituti, Toshkent, O'zbekiston

Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Gorizontal o'q bo'yicha kuchsiz maxsuslikka ega bo'lgan muhitda integro-differensial to'lqin tenglmasidan integral hadining yadrosini aniqlash bo'yicha quyidagi teskari masalani tadqiq qilamiz.

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \mu(z) \left[\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \right] + \int_0^t k(x, \tau) \mu(\tau) \left[\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \right] (x, z, t - \tau) d\tau, \quad (1)$$

$$U|_{t<0} \equiv 0, \quad U_z|_{z=0} = \delta(x) \cdot \delta'(t) \quad (2)$$

$$U|_{z=0} = f(x, t) \quad (3)$$

bu yerda $(x, z, t) \in R^3_T := \{(x, z, t) : x \in R, t > 0, z > 0\}$, $\delta(x), \delta'(t)$ – Dirakning delta funksiyasi va uning hosilasi. Faraz qilaylik, noma'lum $k(x, t)$ yadro x o'zgaruvchiga kuchsiz bog'liq bo'lsin, ya'ni:

$$k(x, t) = k_0(t) + \varepsilon x k_1(t) + \dots, \quad (4)$$

bu yerda ε –kichik parametr. Ushbu ishda biz $\{k_2, k_1\}$ funksiyalarni topish bilan shug'ullanamiz. Buning uchun (1), (2) yechimni

$$U(x, z, t) = U_0(x, z, t) + \varepsilon U_1(x, z, t) + \dots \quad (5)$$

Имамов О.Ш., Бахридинова Ю.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИОФОНТОВОГО ПРИБЛИЖЕНИЕ С ДВУМЯ ПРОСТЫМИ ЧИСЛАМИ И КВАДРАТА ПРОСТОГО ЧИСЛА.....	120
Каландаров Т.С. 2-ЛОКАЛЬНЫЕ АВТОМОРФИЗМЫ АЛГЕБР АРЕНСА	121
Каримова Н. Р. УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПРЕДЕЛИМОСТЬ НЕГАТИВНЫХ СИСТЕМ.....	122
Курбанов Х. Х. ПРОСТРАНСТВО ПОЛУАДДИТИВНЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ И КОМПАКТЫ ДУГУНДЖИ.....	123
Мамуров И., Ахмедов Н. ПРОЕКЦИЯ КРУГА - НЕ ОВАЛЬНАЯ ЛИНИЯ, А МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ЭЛЛИПСА	124
Муминов У.Р. УСЛОВИЯ АССОЦИАТИВНОСТИ И АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГЕБР.....	125
Рахимов А.А., Ризоев У.Р. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ Т-ФАКТОРЫ.....	126
Тиллабаев И.Н. О СЛАБО ПОЧТИ СОВЕРШЕННЫХ ОТОБРАЖЕНИЯХ СУПЕРПАРАКОМПАКТНЫХ ПРОСТРАНСТВ.....	128
Ходжамуратова И.А. СВОЙСТВА ТИПА ПРОДУКТИВНОСТИ	129
Холтураев Х.Ф., Ишметов А.Я. КОМПАКТЫ ДУГУНДЖИ И ПРОСТРАНСТВО ИДЕМПОТЕНТНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕР	129
Шарипова С.А. АБЕЛ КОСАЭРМИТ ҚИСМЛИ ҲАҚИҚИЙ W^* -АЛГЕБРАЛАРНИНГ ИЗОМОРФЛИК ШАРТЛАРИ	130
Эрдонов Б.Х. ДИОФОНТОВА ПРИБЛИЖЕНИЕ С ПРОСТЫМ ЧИСЛОМ, КВАДРАТА И К-ОЙ СТЕПЕНИ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ	132
Эшкобилова Д.Т. О НОВОЙ СИСТЕМЕ ПСЕВДОМЕТРИК, ПОРОЖДАЮЩЕЙ РАВНОМЕРНОСТЬ НА ГИПЕРПРОСТРАНСТВЕ	133
Юлдашев И.Г. ЛОКАЛЬНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ МЕТАБЕЛЕВЫХ ФИЛИФОРМНЫХ АЛГЕБР ЛИ	134

III ШЎЬБА. ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАР ВА МАТЕМАТИК ФИЗИКА.

DIFFERENTIAL EQUATIONS AND MATHEMATICAL PHYSICS.....	136
Abdullayev J.I., Toshturdiyev A.M. KUCHLI TA‘SIRLASHUVDA BO‘LGAN UCH ZARRACHALI SISTEMANING BOG‘LANGAN HOLATLARI	136
Abduxakimov S.X., Vahobov M.A., Samatov B.A. IKKI FERMIONLI SISTEMAGA MOS DISKRET SCHRÖDINGER OPERATORI XOS QIYMATLARINING MAVJUDLIGI.....	137
Ahmadjonova D.D. REDUCTIONAL METHOD IN PERTURBATION THEORY OF SPECTRAL PROBLEM.....	138
Akramov M., Matrasulov D. DYNAMICS OF PT-SYMMETRIC SOLITONS IN DISCRETE NETWORKS	139
Aliev N.M. ASYMPTOTICS OF EIGENVALUES OF THE THREE-PARTICLE HAMILTONIAN ON A ONE-DIMENSIONAL LATTICE	139
Amrilloyeva K.S., Subhonova Z.A., Elmurodova H.B. KASR DIFFUZIYA TENGLAMASI UCHUN TESKARI MASALA	141
Ashurov R.R., Fayziev Yu.E., Tokhtaeva N., Kenjaeva G. ON THE CAUCHY PROBLEM FOR A BOUSSINESQ TYPE TIME-FRACTIONAL EQUATIONS WITH HILFER DERIVATIVE	142
Ashurov.R.R., Mukhiddinova O.T. INITIAL-BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A TIME-FRACTIONAL SUBDIFFUSION EQUATION WITH AN ARBITRARY ELLIPTIC DIFFERENTIAL OPERATOR.....	142
Ashurov.R.R., Shakarova.M.D.TIME-DEPENDENT SOURCE IDENTIFICATION PROBLEM FOR A FRACTIONAL SCHRÖDINGER EQUATION WITH THE RIEMANN-LIOUVILLE DERIVATIVE	143
Ashurov.R.R., Fayziyev Yu. E , Maxmasoatov M.G. ISSIQLIK TARQALISHI TENGLAMASI UCHUN NOLOKAL CHEGARAVIY MASALA.....	144
Ashurov R.R., Fayziev Yu.E., Nosirova D., Amrullaeva D., Latipova Sh. ON THE NON-LOCAL PROBLEMS FOR A BOUSSINESQ TYPE TIME-FRACTIONAL SUBDIFFUSION EQUATIONS..	145
Axmedov O.S. IKKITA BUZILISH CHIZIG‘IGA EGA BO‘LGAN ARALASH TIPDAGI TENGLAMA UCHUN CHEGARAVIY MASALA.....	145
Bozorov Z.R., Davlatova D. S. O’ZGARUVCHAN KOEFFITSIYENTLI ELASTIK-YOPISHQOQ TENGLAMASI UCHUN TESKARI MASALA.....	146
Bozorov Z.R., Avezov B.A.O’ZGARUVCHAN KOFFITSIYENTLI ELASTIK YOPISHQOQLIK TENGLAMASIDAGI INTEGRAL HAD YADROSINI ANIQLASH.	147