

The background features a complex, abstract design. It includes several overlapping circular patterns, some resembling gears or orbits. A central focus is a bright orange and yellow circular area with a blue and white checkered pattern below it. The overall aesthetic is technical and scientific, with various lines, arrows, and geometric shapes scattered throughout.

SCIENCE AND EDUCATION

ISSN 2181-0842

VOLUME 3, ISSUE 5

MAY 2022

SCIENCE AND EDUCATION

SCIENTIFIC JOURNAL

ISSN 2181-0842

VOLUME 3, ISSUE 5

MAY 2022



www.openscience.uz

TABLE OF CONTENTS / MUNDARIJA

EXACT SCIENCES / ANIQ FANLAR

1.	Rayhon Abdug'afforovna Alimova Chiziqli tenglamalar ustida amallar	22
2.	Gulhayo Husniddin qizi Umirqulova, Muxriddin Ural o'g'li Abduraxmonov Fridriks modellari tenzor yig'indisining spektri haqida	28
3.	Gulhayo Husniddin qizi Umirqulova, Nargiza Mardon qizi Kamolova Diskret parametrli ikkinchi tartibli operatorli matritsaning muhim va diskret spektrlari	38
4.	Gulhayo Husniddin qizi Umirqulova, Nargiza Mardon qizi Kamolova Diskret parametrli ikkinchi tartibli operatorli matritsa xos qiymatlarining mavjudligi	49
5.	Gulhayo Husniddin qizi Umirqulova, Shohida Bobojon qizi Ne'matova Chiziqli operatorning sonli tasviri haqida ayrim tasdiqlar va misollar	57
6.	Gulhayo Husniddin qizi Umirqulova, Boymirza Eshquvvat o'g'li Daliyev Ajralgan yadroli xususiy integrallari operatorning xos qiymatlari va xos funksiyalari	69
7.	Fazilat Eshmurod qizi Egamberdiyeva Ikki o'zgaruvchili xususiy integral tenglamalarni yechish	81
8.	Nafisa Ro'ziyevna Qayumova Sonlarning hayotda ahamiyati	85
9.	Bobur Juma o'g'li Tovmamatov Matematik modellashtirishga kirish	93
10.	Kamola Dilmuratovna Jovliyeva, Otabek Ilhomjon o'g'li Allanazarov Singulyar koeffitsiyentli giperbolik turdagi tenglamalar uchun siljish masalasini qo'llash	101
11.	Nasriddin Raximov, Murodjon Ro'ziyev Taqqoslama va uning tatbiqi	106
12.	A.O.Abdug'aniyev, Yulduz Ravshan qizi O'tanazarova Xosmas integralning geometrik masalalarga tatbiqi	113
13.	Толибжон Мамасолиевич Собиржонов Кинематика масаласининг комплекс сонлар ёрдамида ечилиши	118
14.	Уткирбек Яхшликович Тураев, Бойхуроз Шермухаммедович Рахимов Ценность матричной игры принцип минимакса и его экономический анализ	126

NATURAL SCIENCES / TABIIY FANLAR

15.	Гўзал Фахритдиновна Шеркўзиева, Любовь Николоевна Хегай Параметры острой и хронической токсичности пищевой добавки «FASSGEL»	137
16.	Sunny Jamati Case study of treatment responses using Privigen and Biostate with Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) & Acquired von Willebrand syndrome (AvWS)	142
17.	Анвар Нарзуллаевич Асатуллаев Ўткир захарланишларда шошилинич тиббий ёрдам	148
18.	Феруза Ахмеджановна Назарова Ўсимлик ресурслари ва уни муҳофаза қилиш	154
19.	Флора Абдуллаевна Файзиёва Табиий ресурслар ва улардан оқилона фойдаланиш	160
20.	Зебо Мусоевна Анварова Бухоро - Зарафшон дарёси тухфаси	167
21.	Sabohat Kadirkulovna Ahmedova Olot tuman "Tuz kon"ini ekoturizmdagi ahamiyati	172

Diskret parametrli ikkinchi tartibli operatorli matritsaning muhim va diskret spektrlari

Gulhayo Husniddin qizi Umirqulova
Nargiza Mardon qizi Kamolova
Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Fok fazosining nol zarrachali va bir zarrachali qism fazolarining to'g'ri yig'indisida aniqlangan diskret parametrli ikkinchi tartibli operatorli matritsaning spektri tadqiq qilingan. Dastlab uning muhim spektri tavsiflangan. Nollari to'plami qaralayotgan operatorning diskret spektri bilan ustma-ust tushuvchi Fredgolm determinant qurilgan. Diskret spektrning aniq ko'rinishi topilgan.

Kalit so'zlar: operatorli matritsa, diskret parametr, spektr, muhim spektr, diskret spektr, Fredgolm determinanti.

Significant and discrete spectra of a second-order operator matrix with a discrete parameter

Gulhayo Husniddin qizi Umirkulova
Nargiza Mardon qizi Kamolova
Bukhara State University

Abstract: This paper examines the spectrum of a second-order operator matrix with a discrete parameter defined in the correct sum of the zero-particle and single-particle part spaces of the Fock space. Initially, its important spectrum was described. A Fredholm determinant is constructed that overlaps the discrete spectrum of the operator under consideration. A clear view of the discrete spectrum has been found.

Keywords: operator matrix, discrete parameter, spectrum, critical spectrum, discrete spectrum, Fredholm determinant.

$H_0 := \mathbb{C}$ orqali bir o'lchamli kompleks fazoni, $H_1 := L_2[-\pi; \pi]$ orqali, $[-\pi; \pi]$ da aniqlangan kvadrati bilan integrallanuvchi (umuman olganda kompleks qiymatlarni qabul qiluvchi) funksiyalarning Gilbert fazoni belgilaymiz. H_1 va H_2 fazolarning to'g'ri yig'indisini H orqali belgilaymiz, ya'ni $H := H_0 \oplus H_1$.

H fazoning f elementi $f = (f_0, f_1)$ kabi tasvirlanadi. Bu yerda $f_0 \in H_0$ va $f_1 \in H_1$. H fazoning $f = (f_0, f_1)$ va $g = (g_0, g_1)$ elementlari uchun ularning skalyar ko'paytmasi

$$(f, g) = (f_0, g_0)_0 + (f_1, g_1)_1$$

tenglik yordamida topiladi. Bunda

$$(f_0, g_0) = f_0 \cdot \overline{g_0};$$

$$(f_1, g_1)_1 = \int_{-\pi}^{\pi} f_1(t) \overline{g_1(t)} dt.$$

Xuddi shuningdek $f=(f_0, f_1) \in H$ elementning normasi

$$\|f\| = \sqrt{\|f_0\|_0^2 + \|f_1\|_1^2}$$

tenglik yordamida aniqlanadi. Bunda

$$\|f_0\|_0 = |f_0|$$

$$\|f\|_1 = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|_1^2 dt}.$$

Odatda H Gilbert fazosiga Fok fazosining qirrilgan ikki zarrachali qism fazosi deyiladi.

Bizga yaxshi ma'lumki, H Gilbert fazosida aniqlangan har qanday chiziqli chegaralangan B operator hamisha ikkinchi tartibli operatorli matritsa ko'rinishida ya'ni

$$B = \begin{pmatrix} B_{00} & B_{01} \\ B_{10} & B_{11} \end{pmatrix}$$

ko'rinishida tasvirlanadi. Bunda $B_{ij}: H_j \rightarrow H_i, i, j=0,1$ operatorlar chiziqli chegaralangan operatorlardir.

Ta'kidlash joizki, B operator o'z-o'ziga qo'shma bo'lishi uchun

$$B_{00}^* = B_{00}, B_{11}^* = B_{11}, B_{01}^* = B_{10}$$

tengliklarning bajarilishi zarur va yetarlidir.

Ushbu maqolada H.Gilbert fazosida quyidagi ko'rinishdagi diskret parametrli ikkinchi tartibli operatorli matritsalarining spektral xossalari o'rganiladi:

$$A_{\alpha}(m) = \begin{pmatrix} A_{00}(m) & \alpha A_{01} \\ \alpha A_{01}^* & A_{11}(m) \end{pmatrix}.$$

Bunda

$$A_{ii}(m): H_i \rightarrow H_i, i=0,1 \text{ va } A_{01}: H_1 \rightarrow H_0$$

matritsaviy elementlar quyidagi tengliklar yordamida ta'sir qiladi:

$$A_{00}(m)f_0 = m \varepsilon f_0, f_0 \in H_0;$$

$$A_{01}f_1 = \int_{-\pi}^{\pi} v(t) f_1(t) dt, f_1 \in H_1;$$

$$(A_{11}(m)f_1)(x) = (m \varepsilon + u(x)) f_1(x), f_1 \in H_1.$$

Bunda $m \in Z; \varepsilon > 0; \alpha > 0; v(\cdot)$ va $u(\cdot)$ funksiyalar $[-\pi; \pi]$ da aniqlangan haqiqiy qiymatli uzluksiz funksiyalar.

A_{01}^* orqali A_{01} operatorga qo'shma operator belgilangan bo'lib, bu operator

$$A_{01}^*: H_0 \rightarrow H_1, (A_{01}^* f_0)(x) = v(x) f_0, f_0 \in H_0$$

tenglik bilan aniqlanadi.

Haqiqatdan ham

$$(A_{01}f_1, f_0)_0 = A_{01}f_1 \overline{f_0} = \int_{-\pi}^{\pi} v(t) f_1(t) dt \cdot \overline{f_0} = \int_{-\pi}^{\pi} f_1(t) (v(t) \overline{f_0}) dt = \\ = \int_{-\pi}^{\pi} f_1(t) \overline{(v(t) f_0)} dt = (f_1, A_{01}^* f_0)_1.$$

Bunda biz $v(x)$ funksiyaning haqiqiy qiymatli funksiya ekanligidan, ya'ni

$$\overline{v(x)} = v(x), \quad x \in [-\pi; \pi]$$

ekanligidan foydalandik. Yuqoridagi tenglikka ko'ra

$$(A_{01}^* f_0)(x) = v(x) f_0, \quad f_0 \in H_0$$

tenglik o'rinli ekan.

Zamonaviy matematik fizikada A_{01} operatorga yo'qotish operatori, A_{01}^* operatorga paydo qilish operatori, α soniga esa ta'sirlashish parametri deyiladi. Bundan tashqari, $A_\alpha(m)$ operator panjaradagi soni saqlanmaydigan va ikkitadan oshmaydigan zarrachalar sistemasiga mos matrisaviy operatorni tavsiflaydi. Zamonaviy matematik fizikada tadqiq qilinayot umumlashgan Fridriks modeli deb ham ataladi.

Dastlab Fridriks modeli haqida dastlabki tushunchalarni keltirib o'tamiz.

$L_2[-1;1]$ Gilbert fazosida

$$H_\lambda f(x) = xf(x) + \lambda \int_{-1}^1 K(x;y) f(y) dy$$

ko'rinishida ta'sir qiluvchi H_λ operatorni qaraymiz. Bu yerda λ haqiqiy musbat son, $K(x;y)$ esa $[-1;1]^2$ da aniqlangan haqiqiy qiymatli uzluksiz simmetrik funksiya, ya'ni $K(x;y) = K(y;x)$ tenglik o'rinlidir. Bu operator birinchi marta K.Fridriks tomonidan uzluksiz spektr qo'zg'alishlari nazariyasi modeli sifatida [1] ishda qaralgan. Bu maqolada $K(x;y)$ yadro o'zining o'zgaruvchilarining uzluksiz funksiyasi bo'lib, Gyolder shartini va

$$K(x;-1) = K(x;1) = K(-1;y) = K(1;y) = 0, \quad x, y \in [-1;1]$$

shartlarni qanoatlantirishi talab qilingan.

Fridriks tomonidan $\lambda \in R$ parametrning yetarlicha kichik qiymatlarida H_λ va H_0 operatorlar unitar ekvivalent ekanligi isbotlangan, ya'ni H_λ operator $[-1;1]$ ga teng bo'lgan sodda Lebeg spektriga ega ekanligi ko'rsatilgan. 1948-yilda Fridriks o'zining [2] ishida o'z modelini quyidagicha umumlashtirish masalasini taklif qilgan: birinchidan, $[-1;1]$ o'rniga haqiqiy sonlar o'qidagi ixtiyoriy chekli yoki cheksiz bo'lgan ℓ intervalni qarash; ikkinchidan, qiymatlari biror abstrakt Gilbert fazosi bo'lgan f funksiyalarni qarash. ℓ interval cheksiz bo'lgan holda $K(x;y)$ yadro cheksizlikda kamayuvchi bo'lsin degan qo'shimcha shart kiritib Fridriks bu nisbatan umumiy holda H_λ va H_0 operatorlarning unitar ekvivalent ekanligini isbotlagan.

Keyinchalik Fridriksning [1] va [2] ishlari O.A.Ladijenskiy, D.Faddeyevlar tomonidan [3] maqolada va L.D.Faddeyev tomonidan [4] maqolada rivojlantirilgan.

Panjaradagi Fridriks modeli bilan bog'liq tadqiqotlar [5-19] ishlarda olib borilgan. Umumlashgan Fridriks modelining ayrim spektral xossalari [20-30] ishlarda o'rganilgan. Bu xossalari o'z navbatida panjaradagi soni saqlanmaydigan va uchtdan oshmaydigan zarrachalar sistemasiga mos 3-tartibli operatorli matrisalarning muhim va diskret spektrlarini tadqiq qilishda foydalanilgan.

Quyida biz $A_\alpha(m)$ umumlashgan Fridriks modelining muhim spektrini aniqlaymiz. Unga mos keluvchi Fredgolm determinantini quramiz. Uning nollari to'plami sifatida $A_\alpha(m)$ operatorning diskret spektrini topamiz.

1-tasdiq. $A_\alpha(m)$ - chiziqli operator.

Isbot: Agar f va g lar H fazoning ixtiyoriy elementlari bo'lsa, u holda

$$f=(f_0,f_1)\in H, f_0\in H_0, f_1\in H_1;$$

$$g=(g_0,g_1)\in H, g_0\in H_0, g_1\in H_1;$$

bo'lib,

$$af+bg=(af_0+bf_0,af_1+bg_1)\in H.$$

Endi

$$A_\alpha(m)(af+bg)=a A_\alpha(m)f+b A_\alpha(m)g \quad (1)$$

ekanligini tekshiramiz.

1-usul. (1)-tenglikni to'g'ridan-to'g'ri tekshiramiz:

$$\begin{aligned} A_\alpha(m)(af+bg) &= \begin{pmatrix} A_{00}(m) & \alpha A_{01} \\ \alpha A_{01}^* & A_{11}(m) \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} af_0 + bg_0 \\ af_1 + bg_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A_{00}(m)(af_0 + bg_0) + \alpha A_{01}(af_1 + bg_1) \\ \alpha A_{01}^*(af_0 + bg_0) + A_{11}(m)(af_1 + bg_1) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} m\varepsilon(af_0+bg_0) + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(t)(af_1(t)+bg_1(t))dt \\ \alpha v(x)(af_0+bg_0) + (m\varepsilon+u(x))(af_1(x)+bg_1(x)) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} am\varepsilon f_0 + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(t)f_1(t)dt \\ a\alpha v(x)f_0 + a(m\varepsilon+u(x))f_1(x) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} am\varepsilon g_0 + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(t)g_1(t)dt \\ a\alpha v(x)g_0 + a(m\varepsilon+u(x))g_1(x) \end{pmatrix} = \\ &= a A_\alpha(m)f + b A_\alpha(m)g. \end{aligned}$$

Demak $A_\alpha(m)$ chiziqli operator ekan.

2-usul. Quyidagi

$$A_{00}(m)(af_0+bg_0)=aA_{00}(m)f_0+bA_{00}(m)g_0;$$

$$A_{01}(af_1+bg_1)=aA_{01}f_1+bA_{01}g_1;$$

$$A_{01}^*(af_0+bg_0)=aA_{01}^*f_0+bA_{01}^*g_0;$$

$$A_{11}(m)(af_1+bg_1)=aA_{11}(m)f_1+bA_{11}(m)g_1$$

tengliklarni tekshiramiz.

$$1) A_{00}(m)(af_0+bg_0)=m\varepsilon(af_0+bg_0)= m\varepsilon af_0 + m\varepsilon bg_0 = a A_{00}(m)f_0 + b A_{00}(m)g_0;$$

$$2) A_{01}(af_1+bg_1)=\int_{-\pi}^{\pi} v(t)(af_1(t) + bg_1(t))dt=$$

$$=a\int_{-\pi}^{\pi} v(t)f_1(t)dt+b\int_{-\pi}^{\pi} v(t)g_1(t)dt=aA_{01}(m)f_1 + bA_{01}(m)g_1;$$

$$3) (A_{01}^*(af_0+bg_0))(x)=$$

$$\alpha v(x)(af_0+bg_0)=a\alpha v(x)f_0+b\alpha v(x)g_0=a(A_{01}^*f_0)(x)+b(A_{01}^*g_0)(x);$$

$$4) (A_{11}(m)(af_1+bg_1))(x) = (m\varepsilon+u(x))(af_1(x)+bg_1(x)) = \\ =a(m\varepsilon+u(x))f_1(x)+b(m\varepsilon+u(x))g_1(x)=a(A_{11}(m)f_1)(x) + b(A_{11}(m)g_1)(x));$$

Demak $A_\alpha(m)$ operatorning to'rtta matritsaviy elementlari chiziqli operator ekan. Shu sababli $A_\alpha(m)$ ning o'zi ham chiziqli operator bo'ladi. 1-tasdiq to'liq isbotlandi.

2-tasdiq. $A_\alpha(m)$ chegaralangan operator.

Isbot. Tasdiqni isbotlash uchun shunday $C_\alpha(m)>0$ soni topilib, barcha $f \in H$ elementlar uchun

$$\|A_\alpha(m)f\| \leq C_\alpha(m)\|f\| \quad (2)$$

Haqiqatdan ham ,

$$\|A_\alpha(m)f\|^2 = |m\varepsilon f_0 + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(t)f_1(t)dt|^2 + \int_{-\pi}^{\pi} |\alpha v(x)f_0 + (m\varepsilon + u(x))f_1(x)|^2 dx \leq \\ 2m^2\varepsilon^2|f_0|^2 + 2\alpha^2|\int_{-\pi}^{\pi} v(t)f_1(t)dt|^2 + 2\alpha^2 \int_{-\pi}^{\pi} |v(t)|^2 dt \cdot |f_0|^2 + \\ + 2\int_{-\pi}^{\pi} |m\varepsilon + u(x)|^2 \cdot |f_1(x)|^2 dx \leq 2m^2\varepsilon^2|f_0|^2 + 2\alpha^2 \int_{-\pi}^{\pi} |v(t)|^2 dt \cdot \\ \int_{-\pi}^{\pi} |f_1(t)|^2 dt + \\ + 2\alpha^2 \int_{-\pi}^{\pi} |v(t)|^2 |f_0|^2 dt + 2 \max_{-\pi \leq x \leq \pi} |m\varepsilon + u(x)|^2 \int_{-\pi}^{\pi} |f_1(x)|^2 dx = \\ = (2m^2\varepsilon^2 + 2\alpha^2\|v\|^2) \cdot \|f_0\|_0^2 + (2\alpha^2\|v\|^2 + 2 \max_{-\pi \leq x \leq \pi} (m\varepsilon + u(x))^2).$$

$$\|f_1\|_1^2 \leq C_\alpha^2(m)(\|f_0\|_0^2 + \|f_1\|_1^2) = C_\alpha^2(m)\|f\|^2,$$

bu yerda,

$$C_\alpha^2(m) = \max\{2m^2\varepsilon^2 + 2\alpha^2\|v\|^2, 2\alpha^2\|v\|^2 + 2 \max_{-\pi \leq x \leq \pi} (m\varepsilon + u(x))^2\}.$$

Shunday qilib

$$\|A_\alpha(m)f\|^2 \leq C_\alpha(m)\|f\|,$$

ya'ni (2) tengsizlik o'rinli ekan.

Isbot jarayonida biz Koshi-Bunyakovskiy deb ataluvchi

$$|\int_{-\pi}^{\pi} v(t)f_1(t)dt|^2 \leq \int_{-\pi}^{\pi} |v(t)|^2 dt \cdot \int_{-\pi}^{\pi} |f_1(t)|^2 dt$$

tengsizlikdan va

$$|a+b|^2 \leq 2|a|^2 + 2|b|^2$$

elementar tengsizlikdan foydalandik.

Ta'rifga ko'ra $A_\alpha(m)$ chegaralangan operator ekan.

3-tasdiq. $A_\alpha(m)$ o'z-o'ziga qo'shma operator.

Isbot: Tasdiqni isbotlash uchun

$$(A_\alpha(m)f, g) = (f, A_\alpha(m)g)$$

tenglik barcha $f, g \in H$ elementlar uchun bajarilishini tekshiramiz. Bu tenglikni tekshirishni ikki xil usulda amalga oshiramiz.

1-usul. To'g'ridan-to'g'ri hisoblashlar yordamida tekshirish.

2-usul esa $A_\alpha(m)$ operatorning matritsaviy elementlari uchun

$$A_{00}^*(m) = A_{00}(m);$$

$$A^*_{11}(m) = A_{11}(m);$$

tengliklarni tekshiramiz.

1-usul. Ixtiyoriy $f=(f_0,f_1) \in H$ va $g=(g_0,g_1) \in H$ elementlar uchun $(A_\alpha(m)f, g)$ ni qaraymiz:

$$\begin{aligned} (A_\alpha(m)f, g) &= (A_{00}(m)f_0 + \alpha A_{01}f_1, g_0)_0 + (\alpha A^*_{01}f_0 + A_{11}(m)f_1, g_1)_1 = \\ &= (m\varepsilon f_0 + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(t)f_1(t)dt) \overline{g_0} + \int_{-\pi}^{\pi} (\alpha v(x)f_0 + (m\varepsilon + \\ &\quad u(x))f_1(x)) \overline{g_1(x)} dx = \\ &= m\varepsilon f_0 \overline{g_0} + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(t)f_1(t)dt \overline{g_0} + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(x)f_0 \overline{g_1(x)} dx + \\ &+ \int_{-\pi}^{\pi} (m\varepsilon + u(x))f_1(x) \overline{g_1(x)} dx = f_0(m\varepsilon \overline{g_0} + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(t) \overline{g_1(t)} dt) + \\ &\quad + \int_{-\pi}^{\pi} f_1(t) (\alpha v(t) \overline{g_0} + (m\varepsilon + u(t)) \overline{g_1(t)}) dt = \\ &\quad f_0 \overline{(m\varepsilon g_0 + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(t)g_1(t)dt)} + \\ &+ \int_{-\pi}^{\pi} f_1(t) \overline{(\alpha v(t)g_0 + (m\varepsilon + u(t))g_1(t))} dt = (f_0, A_{00}(m)g_0 + \alpha A_{01}g_1)_0 + \\ &\quad + (f_1, \alpha A^*_{01}g_0 + A_{11}(m)g_1)_1 = (f_1, A_\alpha(m)g). \end{aligned}$$

Demak, $A^*_{01}(m) = A_\alpha(m)$, ya'ni $A_\alpha(m)$ - o'z - o'ziga qo'shma operator ekan. Bunda biz ε – haqiqiy musbat son, m - butun son, α – haqiqiy musbat son, $v(\cdot)$ va $u(\cdot)$ funksiyalar esa $[-\pi; \pi]$ kesmada aniqlangan haqiqiy qiymatli uzluksiz funksiya ekanligidan foydalandik.

2-usul. Ixtiyoriy $f_0, g_0 \in H_0$ elementlar uchun $(A_{00}(m)f_0, g_0)_0$ ni qaraymiz.

$$(A_{00}(m)f_0, g_0)_0 = m\varepsilon f_0 \overline{g_0} = f_0 m\varepsilon \overline{g_0} = f_0 \overline{m\varepsilon g_0} = (f_0, A_{00}(m)g_0)_0,$$

ya'ni $A^*_{00}(m) = A_{00}(m)$ ekan.

Endi ixtiyoriy $f_1, g_1 \in H_1$ elementlar uchun $(A_{11}(m)f_1, g_1)_1$ ni qaraymiz.

$$\begin{aligned} (A_{11}(m)f_1, g_1)_1 &= \int_{-\pi}^{\pi} (m\varepsilon + u(t))f_1(t) \overline{g_1(t)} dt = \int_{-\pi}^{\pi} f_1(t) (m\varepsilon + u(t)) \overline{g_1(t)} dt = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} f_1(t) \overline{(m\varepsilon + u(t))g_1(t)} dt = (f_1, A_{11}(m)g_1)_1, \end{aligned}$$

ya'ni $A^*_{11}(m) = A_{11}(m)$ ekan.

3-tasdiq to'liq isbotlandi.

$A_\alpha(m)$ operatorning muhim spektrini o'rganish maqsadida uni

$$A_\alpha(m) = A_0(m) + \alpha V$$

ko'rinishida tasvirlab olamiz.

Bu yerda $A_0(m) = A_\alpha(m) / \alpha=0$, ya'ni

$$A_0(m) = \begin{pmatrix} A_{00}(m) & 0 \\ 0 & A_{11}(m) \end{pmatrix},$$

V-operator esa $V = \frac{1}{\alpha} (A_\alpha(m) - A_0(m))$ kabi aniqlangan, ya'ni

$$V = \begin{pmatrix} 0 & A_{01} \\ A^*_{01} & 0 \end{pmatrix}$$

V operatorning 2 o'lchamli operator ekanligi ko'rsatamiz. Dastlab ImV ni, ya'ni V operatorning qiymatlar sohasini topamiz. Aniqlanishiga ko'ra

$$\text{Im}V = \{(a, bv(x)) : a, b \in \mathbb{C}\}$$

tenglik o‘rinlidir.

ImV ga tegishli bo‘lgan

$$f^{(1)} = (1, 0), f^{(2)} = (0, v(x))$$

elementlarni tanlaymiz va ular chiziqli bog‘lanmagan elementlarni tashkil qiladi.

Haqiqatdan ham

$$\beta f^{(1)} + \gamma f^{(2)} = \beta(1, 0) + \gamma(0, v(x)) = (\beta, 0) + (0, \gamma v(x)) = (\beta, \gamma v(x)) = \theta.$$

Oxirgi tenglikdan $\beta = 0$ va $\gamma v(x) = 0$, ya’ni $\beta = 0, \gamma = 0$ ekanligini hosil qilamiz.

Shunday qilib $f^{(1)}$ va $f^{(2)}$ elementlar chiziqli bog‘lanmagan elementlar ekan.

ImV qism fazoning ixtiyoriy f elementini olamiz, u holda shunday $a, b \in \mathbb{C}$ kompleks sonlar topilib, f element $f = (a, bv(x))$ ko‘rinishida tasvirlanadi. Shu sababli

$$f = (a, bv(x)) = (a, 0) + (b, v(x)) = a(1, 0) + b(0, v(x)) = af^{(1)} + bf^{(2)}$$

Demak f element chiziqli bog‘lanmagan $f^{(1)}$ va $f^{(2)}$ elementlarning chiziqli kombinatsiyasidan iborat ekan. Ta’rifga ko‘ra

$$\dim \text{Im}V = 2,$$

ya’ni V operator 2 o‘lchamli operator ekan.

Chekli o‘lchamli qo‘zg‘alishlarda muhim spektrning o‘zgarmasligi haqidagi mashhur Veyl teoremasiga ko‘ra $A_\alpha(m)$ va $A_0(m)$ operatorlarning muhim spektrlari ustma-ust tushadi. Aniqlanishiga ko‘ra $A_0(m)$ diagonal operatoridir. Shuning uchun

$$\sigma(A_0(m)) = \sigma(A_{00}(m)) \cup \sigma(A_{11}(m))$$

tenglik o‘rinli bo‘ladi. $A_{00}(m)$ operatorning spektri

$$\sigma(A_{00}(m)) = \sigma_{disc}(A_{00}(m)) = \{m\varepsilon\}$$

kabi aniqlanadi.

$A_{11}(m)$ operatorning spektri esa sof muhim spektr bo‘lib,

$$\sigma(A_{11}(m)) = \sigma_{ess}(A_{11}(m)) = [m\varepsilon + u_{min}, m\varepsilon + u_{max}]$$

tenglik o‘rinlidir.

Bu yerda $A_{11}(m)$ operator $m\varepsilon + u(\cdot)$ funksiyaga ko‘paytirish operatori bo‘lganligi bois, uning spektri sof muhim spektr bo‘lib, $m\varepsilon + u(\cdot)$ funksiyaning qiymatlar sohasi bilan ustma-ust tushadi.

u_{min} va u_{max} orqali

$$u_{min} = \min_{-\pi \leq x \leq \pi} u(x), u_{max} = \max_{-\pi \leq x \leq \pi} u(x)$$

sonlari belgilangan.

Demak $A_\alpha(m)$ operatorning muhim spektri α ta’sirlashish parametriga bog‘liq bo‘lmasdan, u uchun

$$\sigma_{ess}(A_\alpha(m)) = [m\varepsilon + u_{min}, m\varepsilon + u_{max}]$$

Endi $A_\alpha(m)$ operatorning diskret spektrini o‘rganinish masalasini qaraymiz. Ushbu maqsadda $\mathbb{C} \setminus [m\varepsilon + u_{min}, m\varepsilon + u_{max}]$ sohada regulyar bo‘lgan

$$\Delta_\alpha(m; z) = m\varepsilon - z - \alpha^2 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\vartheta^2(t)dt}{u(t)-z}$$

funksiyani qaraymiz.

Odatda $\Delta_\alpha(m; \cdot)$ funksiyaga $A_\alpha(m)$ operatorga mos Fredholm determinanti deyiladi. Quyidagi lemma $A_\alpha(m)$ operatorning xos qiymatlari va $\Delta_\alpha(m; \cdot)$ funksiya nollari orasidagi bog'lanishni ifodalaydi.

1-lemma. $z \in \mathbb{C} \setminus [m\varepsilon + u_{min}, m\varepsilon + u_{max}]$ soni $A_\alpha(m)$ operatorning xos qiymati bo'lishi uchun $\Delta_\alpha(m; z) = 0$ bo'lishi zarur va yetarlidir.

Isbot. Zaruriyligi. Faraz qilaylik $z \in \mathbb{C} \setminus [m\varepsilon + u_{min}, m\varepsilon + u]$ operatorning xos qiymati, $f = (f_0, f_1) \in H$ esa unga mos xos vektor funksiya bo'lsin. U holda $f = (f_0, f_1) \in H$ element

$$A_\alpha(m)f = zf$$

tenglamani, ya'ni f_0 va f_1 elementlar

$$\begin{cases} m\varepsilon f_0 + \alpha \int_{-\pi}^{-\pi} v(t)f_1(t)dt = zf_0 \\ \alpha v(x)f_0 + (m\varepsilon + u(x))f_1(x) = zf_1(x) \end{cases} \quad (3)$$

tenglamalar sistemasini qanoatlantiradi. (3) tenglamalar sistemasini unga teng kuchli bo'lgan

$$\begin{cases} (m\varepsilon - z)f_0 + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(t)f_1(t)dt = 0 \\ \alpha v(x)f_0 + (m\varepsilon + u(x))f_1(x) = zf_1(x) \end{cases} \quad (4)$$

ko'rinishida yozib olamiz. $z \in \mathbb{C} \setminus [m\varepsilon + u_{min}, m\varepsilon + u_{max}]$ bo'lganligi bois barcha $x \in [-\pi; \pi]$ nuqtalarda $m\varepsilon + u(x) - z \neq 0$ munosabat bajariladi. (4) tenglamalar sistemasining ikkinchi tengligidan $f_1(x)$ ni quyidagicha topib olamiz:

$$f_1(x) = \frac{-\alpha v(x)f_0}{m\varepsilon + u(x) - z} \quad (5)$$

$f_1(x)$ uchun topilgan (5) ifodani (4) tenglamalar sistemasining birinchi tengligiga qo'yamiz:

$$(m\varepsilon - z)f_0 - \alpha^2 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\vartheta^2(t)dt}{u(t)-z} f_0 = 0$$

yoki

$$[m\varepsilon - z - \alpha^2 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\vartheta^2(t)dt}{u(t)-z}] f_0 = 0$$

yoki

$$\Delta_\alpha(m; z)f_0 = 0 \quad (6)$$

Agar (6) tenglikda $f_0 = 0$ bo'lsa, u holda (5) tenglikka ko'ra $f_1(x) = 0$, ya'ni $f = (0, 0) = \theta$ bo'ladi. Bu esa f ning xos vector funksiya ekanligiga zid. Demak $f_0 \neq 0$, shu sababli (6) tenglikdan $\Delta_\alpha(m; z) = 0$ ekanligi kelib chiqadi. Zaruriyligi isbotlandi.

Yetarliligi. Faraz qilaylik biror $z \in \mathbb{C} \setminus [m\varepsilon + u_{min}, m\varepsilon + u_{max}]$ soni uchun $\Delta_\alpha(m; z) = 0$ bo'lsin. $g = (g_0, g_1)$ vektor funksiya koordinatalarini

$$g_0 = \text{const} \neq 0, g_1(x) = -\frac{\alpha v(x)g_0}{m\varepsilon + u(x) - z_0} \quad (7)$$

kabi aniqlaymiz, hamda $A_\alpha(m)g = z_0g$ tenglik bajarilishini ko'rsatamiz:

$$A_{00}(m)g_0 + \alpha A_{01}g_1 - z_0g_0 = m\varepsilon g_0 + \alpha \int_{-\pi}^{\pi} v(t) \left(-\frac{\alpha v(t)g_0}{m\varepsilon + u(t) - z_0} \right) dt - z_0g_0 =$$

$$= [m\varepsilon - z_0 - \alpha^2 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{v^2(t)dt}{m\varepsilon + u(t) - z_0}]g_0 = \Delta_\alpha(m; z)g_0 = 0;$$

$$\alpha(A_{01}^*g_0)(x) + (A_{11}(m)g_1)(x) - z_0g_1(x) = \alpha v(x)g_0 + (m\varepsilon + u(x)g_1(x)) -$$

$$- z_0g_1(x) = \alpha v(x)g_0 + (m\varepsilon + u(x) - z_0)g_1(x) = \alpha v(x)g_0 +$$

$$+ (m\varepsilon + u(x) - z_0) \left(-\frac{\alpha v(x)g_0}{m\varepsilon + u(x) - z_0} \right) = (\alpha v(x) - \alpha v(x))g_0 = 0.$$

Shunday qilib qurilgan $g = (g_0, g_1)$ vektor funktsiya $A_\alpha(m)g = z_0g$ tenglikni qanoatlantirar ekan. Aniqlanishiga ko'ra $g_0 \in H_0$ va $g_1 \in H_1$. Ta'rifga ko'ra z_0 soni $A_\alpha(m)$ operator uchun xos qiymat ekan. Lemma isbotlandi.

1-lemmadan $A_\alpha(m)$ operatorning spektri uchun quyidagi natija kelib chiqadi:

1-natija. $A_\alpha(m)$ operatorning diskret spektri uchun

$$\sigma_{disc}(A_\alpha(m)) = \{z \in \mathbb{C} \setminus [m\varepsilon + u_{min}, m\varepsilon + u_{max}]: \Delta_\alpha(m; z) = 0\}$$

tenglik o'rinlidir.

1-lemma va 1-tasdiq yordamida $A_\alpha(m)$ operatorning spektri

$$\sigma(A_\alpha(m)) = [m\varepsilon + u_{min}, m\varepsilon + u_{max}] \cup$$

$$\cup \{z \in \mathbb{C} \setminus [m\varepsilon + u_{min}, m\varepsilon + u_{max}]: \Delta_\alpha(m; z) = 0\}$$

kabi tavsiflanishi kelib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Friedrichs K.O. Uber die Spectralzerlegung einee Integral operators. *Mathematische Annalen*. 115 (1938), pp. 249-272.
2. Friedrichs K.O. On the perturbation of continuous spectra. *Communications on Pure and Applied Mathematics*. 1 (1948), pp. 361-406.
3. Ладыженская О.А., Фаддеев Л.Д. К теории возмущений непрерывного спектра. *145:2* (1962), С. 301-304.
4. Фаддеев Л.Д. О модели Фридрихса в теории возмущений непрерывного спектра. В. кн.: Труды математического математического института АН СССР. М.: Наука. 73 (1964), С. 292-313.
5. Albeverio S., Lakaev S., Muminov Z. The threshold effects for a family of Friedrichs models under rank one perturbation. *J. Math. Anal. Appl.* 330:2 (2007), pp. 1152-1168.
6. Бахронов Б.И. О виртуальном уровне модели Фридрихса с двумерным возмущением. *Наука, техника и образование*. 72:8 (2020), С. 13-16.
7. Умиркулова Г.Х. Существенный и дискретный спектры семейства моделей Фридрихса. *Наука и образование сегодня*. 60:1 (2021), С. 17-20.
8. Умиркулова Г.Х. Оценки для граней существенного спектра модельного оператора трех частиц на решетке. *ВНО*. 16-2 (94) (2020), С. 14-17.

9. Умиркулова Г.Х. Панжарадаги уч заррачали модель операторга мос канал операторлар ва уларнинг спектрлари. *Scientific progress* 2 (3) (2021), С. 51-57
10. Умиркулова Г.Х. Существенный и дискретные спектры семейства моделей Фридрихса. *Наука и образование сегодня*. 60:1 (2021), С. 17-20.
11. Umirqulova G.H. Uch zarrachali model operatorning hos funksiyalari uchun Faddeev tenglamasi. *Scientific progress*. 2:1 (2021), 1413-1420 b.
12. Умиркулова Г.Х. Местоположение собственных значений двух семейств моделей Фридрихса. *НТО*, 77:2, часть 2 (2021), С. 56-60.
13. Umirqulova G.H. Uch zarrachali model operator hos funksiyalari uchun simmetrik Faddeyev tenglamasi. *Scientific progress*. 2 (3) (2021), С. 406-413.
14. Bahronov B.I., Rasulov T.H. Structure of the numerical range of Friedrichs model with rank two perturbation. *European science*. 51:2 (2020), pp. 15-18.
15. Rasulova Z.D. Investigations of the essential spectrum of a model operator associated to a system of three particles on a lattice. *J. Pure and App. Math.: Adv. Appl.*, 11:1 (2014), pp. 37-41.
16. Rasulova Z.D. On the spectrum of a three-particle model operator. *Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications*, 25 (2014), pp. 57-61.
17. Rasulov T.H., Rasulova Z.D. Essential and discrete spectrum of a three-particle lattice Hamiltonian with non-local potentials. *Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics*, 5:3 (2014), pp. 327-342.
18. Расулов Т.Х., Расулова З.Д. Спектр одного трехчастичного модельного оператора на решетке с нелокальными потенциалами. *Сибирские электронные математические известия*. 12 (2015), С. 168-184.
19. Расулова З.Д., Хамроева Х.Ю. Числовой образ модели Фридрихса с одномерным возмущением. *Молодой учёный*. 61:7 (2014), С. 27-29.
20. Расулов Т.Х., Дилмуродов Э.Б. Исследование числовой области значений одной операторной матрицы. *Вестник Самарского государственного технического университета, Серия физ.-мат. науки*, 35:2 (2014), С. 50-63.
21. Лакаев С.Н., Расулов Т.Х. Об эффекте Ефимова в модели теории возмущений существенного спектра. *Функциональный анализ и его приложения*, Т. 37 (2003), вып. 1, стр. 81-84.
22. Лакаев С.Н., Расулов Т.Х. Модель в теории возмущений существенного спектра многочастичных операторов. *Математические заметки*, Т. 73 (2003), вып. 4, стр. 556-564.
23. Rasulov T.H., Dilmurodov E.B. Eigenvalues and virtual levels of a family of 2×2 operator matrices. *Methods Func. Anal. Topology*, 25:1 (2019), pp. 273-281.
24. Rasulov T.H., Dilmurodov E.B. Analysis of the spectrum of a 2×2 operator matrix. *Discrete spectrum asymptotics*. *Nanosystems: Phys., Chem., Math.*, 11:2 (2020), pp. 138-144.

25. Rasulov T.H., Dilmurodov E.B. Threshold analysis for a family of 2×2 operator matrices. *Nanosystems: Phys., Chem., Math.*, 10:6 (2019), pp. 616-622.
26. Расулов Т.Х., Дилмуродов Э.Б. (2020). Бесконечность числа собственных значений операторных (2×2) -матриц. Асимптотика дискретного спектра. *ТМФ*. 3(205), С. 368-390.
27. Albeverio S., Lakaev S.N., Rasulov T.H. On the Spectrum of an Hamiltonian in Fock Space. *Discrete Spectrum Asymptotics. Journal of Statistical Physics*, 127:2 (2007), pp. 191-220.
28. Albeverio S., Lakaev S.N., Rasulov T.H. The Efimov Effect for a Model Operator Associated with the Hamiltonian of non Conserved Number of Particles. *Methods of Functional Analysis and Topology*, 13:1 (2007), pp. 1-16.
29. Rasulov T.H., Dilmurodov E.B. Estimates for the Bounds of the Essential Spectrum of a 2×2 Operator Matrix. *Contemporary Mathematics*. 1:4 (2020), pp. 170-186.
30. Dilmurodov E.B. On the virtual levels of one family matrix operators of order 2. *Scientific reports of Bukhara State University*. 2019, no. 1, pp. 42-46.